



Comment reconnaître les rongeurs ?

Campagnol amphibie




10-14 cm 16-23 cm

Surmulot ou Rat d'égout




16-20 cm 19-27 cm

Rat musqué



18-29 cm 25-35 cm

Ragondin



25-40 cm 35-65 cm

Contacts :

Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton
BP 50 - 35 ter rue des Sables - 85230 Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 20 12 - servicemarais@smgemb.fr



Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf
Impasse de la Gaudinière - 85630 Barbâtre
02 51 39 55 62 - contact@baie-bourgneuf.com - www.baie-bourgneuf.com

Luttons contre les rongeurs aquatiques nuisibles

et protégeons nos espèces patrimoniales

Le Ragondin et le Rat Musqué sont deux espèces de rongeurs aquatiques, introduites par l'homme sur nos marais, qui envahissent les zones humides. Ils sont classés nuisibles en raison des dégâts multiples qu'ils peuvent occasionner notamment sur les cultures, les roselières et sur les berges des fossés et cours d'eau.



Depuis plusieurs années, une lutte collective est organisée afin de limiter les populations de ces deux rongeurs. **La principale méthode de lutte, qui peut être pratiquée par tout le monde, toute l'année et en tout lieu, est le piégeage avec des cages-pièges, utilisées avec des appâts végétaux (carottes, pommes, etc.).**

Cette méthode de lutte sélective permet de relâcher les espèces non recherchées ou protégées comme le Campagnol amphibie et la Loutre d'Europe.

Le Syndicat Mixte de Gestion Écologique du Marais Breton assure la collecte des Ragondins et Rats musqués capturés et morts. Il s'engage à vous indemniser chaque capture par une prime.

Comment participer à la lutte ?

- Obtenir l'accord des propriétaires pour les terrains qui ne m'appartiennent pas.
- Faire une déclaration de piégeage à la mairie de la commune où je souhaite agir (déclaration valable un an, du 1^{er} juillet au 30 juin de l'année suivante).
- Utiliser des cages-pièges qui capturent et maintiennent l'animal vivant.
- Visiter les cages-pièges tous les matins.
- Mettre à mort les animaux nuisibles capturés, immédiatement, sans souffrance et les ramener à la collecte.
- Relâcher immédiatement sur place les autres animaux capturés accidentellement. En cas de doute sur une espèce, je contacte un technicien du Syndicat Mixte de Gestion Écologique.
- Me protéger en portant des bottes et des gants car les animaux peuvent être porteurs de maladies.

Espèces recherchées dans le cadre de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles

Le Ragondin

Origine :	Amérique du Sud
Taille :	Jusqu'à 1 mètre avec la queue
Poids :	6 à 7 kg
Pelage :	Marron poils courts et longs
Caractéristique :	Queue cylindrique
Reproduction :	2 à 3 fois par an, 5 à 7 petits par portée
Alimentation :	Herbivore



Le Rat Musqué



Origine :	Amérique du Nord
Taille :	Jusqu'à 60 cm avec la queue
Poids :	Environ 1 kg
Pelage :	Roux avec poils courts
Caractéristique :	Queue aplatie latéralement
Reproduction :	3 fois par an, 6 à 8 petits par portée
Alimentation :	Herbivore

Autre rongeur invasif pouvant être régulé

Le Surmulot ou Rat d'égout

Origine :	Asie
Taille :	Jusqu'à 45 cm avec la queue
Poids :	Environ 350 g
Pelage :	Gris brun sur le dos et gris blanc sous le ventre
Caractéristique :	Tête fine et pointue avec des petites oreilles visibles, queue sans poil
Reproduction :	4 à 7 fois par an, 6 à 12 petits par portée
Alimentation :	Omnivore



Espèces protégées

Le Campagnol amphibie : "Rat d'eau"

Origine :	France, Espagne et Portugal
Taille :	Jusqu'à 30 cm avec la queue
Poids :	Environ 200 g
Pelage :	Épais brun foncé dessus et gris brun dessous
Caractéristique :	Tête et corps arrondi, petites oreilles peu visibles et queue ronde poilue
Reproduction :	3 à 4 fois par an, 2 à 5 petits par portée
Alimentation :	Herbivore



Attention à ne pas le confondre avec le Surmulot ou le jeune Rat musqué (queue et couleur du pelage différentes).

La Loutre d'Europe

Origine :	Europe, Asie et Afrique du Nord
Taille :	Jusqu'à 120 cm avec la queue
Poids :	5 à 12 kg
Pelage :	Brun foncé dessus et blanc gris dessous
Caractéristique :	Queue puissante large à la base, s'éffilant vers le bout de 30 à 40 cm, pattes palmées et petites oreilles
Reproduction :	1 fois par an, 1 à 3 petits par portée
Alimentation :	Piscivore, mange également des écrevisses et quelques jeunes rats musqués



Ces espèces n'ont aucun impact sur le milieu mais sont très sensibles à la dégradation des zones humides.

Le Campagnol amphibie et la Loutre d'Europe sont protégés en France. Leur capture, destruction ou perturbation accidentelle sont interdites et passibles d'amendes. Si vous en capturez ou en trouvez morts, merci de le signaler à l'Association pour le développement du bassin versant de la baie de Bourgneuf.

La population de Campagnol amphibie est en régression en France en raison de la disparition des plantes de bord de berge et de la présence du Ragondin et du Rat musqué. Les marais de Noirmoutier et le Marais breton sont l'un des bastions de l'espèce en France.